



Vắc-xin COVID-19: Pfizer và Moderna

THỜI ĐIỂM CHÍCH LIỀU CHÍNH THỨ HAI

KHI NÀO TÔI CẦN CHÍCH LIỀU VẮC-XIN THỨ HAI?

Thời điểm tối ưu để chích liều chính thứ 2 tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của quý vị.




Nếu quý vị dưới 65 tuổi và không bị suy giảm miễn dịch:

- Quý vị có thể có lợi hơn khi chích liều chính thứ hai 8 tuần sau liều đầu tiên của mình, đặc biệt nếu quý vị là nam giới trong độ tuổi 12-39. Lý do là khoảng thời gian dài hơn giữa liều đầu tiên và liều thứ hai có thể làm tăng hiệu quả bảo vệ của vắc-xin và giúp giảm nguy cơ bị viêm cơ tim (myocarditis), vốn đã hiếm gặp. Nam giới trẻ tuổi (độ tuổi 12-39) có nguy cơ bị chứng viêm cơ tim cao nhất.
- Quý vị cần chích liều chính thứ hai sớm hơn nếu quý vị cần được bảo vệ đầy đủ sớm hơn: ít nhất 3 tuần sau liều Pfizer đầu tiên và ít nhất 4 tuần sau liều Moderna đầu tiên của mình. Những ví dụ cho trường hợp này là khi cộng đồng nơi quý vị sinh sống, làm việc hoặc đi lại/du lịch có mức độ lây nhiễm cao và/hoặc khi quý vị có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn.
- Xin lời khuyên của bác sĩ nếu quý vị không chắc chắn về thời điểm tốt nhất để chích liều thứ hai dựa trên hoàn cảnh của quý vị.

Nếu quý vị bị suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nặng và/hoặc từ 65 tuổi trở lên

- Quý vị cần chích liều chính thứ hai sớm hơn - ít nhất 3 tuần sau liều Pfizer đầu tiên và ít nhất 4 tuần sau liều Moderna đầu tiên của mình.
- Quý vị cũng cần chích liều chính thứ ba ít nhất 4 tuần sau liều chính thứ hai nếu quý vị bị suy giảm miễn dịch.



Nếu quý vị đã trễ chưa chích liều thứ hai, hãy cố gắng chích liều này sớm nhất ngay khi có thể. Quý vị có thể tiếp tục chích liều tiếp theo trong loạt các liều mà quý vị đã ngưng giữa chừng. Quý vị không cần phải bắt đầu lại từ liều đầu tiên.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules.