

# コロナウイルス感染症 (COVID-19)

## 最近の更新

11/6/20：シェルターにおける隔離と検疫及びペットの管理に関する情報を更新しました。

## 1. 新型コロナウイルスとは？

コロナウイルスは多くのウイルスが属するウイルスの一種です。それらの多くは動物に感染しますが、動物からのコロナウイルスの一部が変異して人に感染し、人から人へと拡散するものもあります。これが現在の新型コロナウイルスで起こったのです。人にみられるコロナウイルスの病状は、通常風邪のような軽度から中等度のものです。しかし、SARSやMERSウイルスのように、肺炎などの深刻な感染症を引き起こすものもあります。

## 2. 人にみられるCOVID-19の一般的な症状は何ですか？

COVID-19の症状には、以下の症状が複数現れることがあります。症状には発熱、咳、息切れまたは呼吸困難、悪寒、倦怠感、筋肉痛または体の痛み、頭痛、喉の痛み、吐き気または嘔吐、下痢、鼻づまりまたは鼻水、または味覚や嗅覚の新たな喪失が含まれます。ただし、この症状のリストが全てではありません。症状の詳細については、[ph.lacounty.gov/covidcare](http://ph.lacounty.gov/covidcare)を参照してください。

## 3. COVID-19はどのように拡散しますか？

他の呼吸器系の病気と同様、人に感染するコロナウイルスは、一般的に以下のような経路で感染者から他者へと拡散します。

- 咳、くしゃみ、及び話をする際に出される飛沫
- 感染者のお世話をするなどの個人的な濃厚接触
- COVID-19は、ウイルスが付着している物の表面や物体に触れてから、口、鼻、または目に触れることによっても拡散する可能性があります。これがウイルスの主要な拡散経路とは考えられていません。COVID-19に感染していても自覚症状のない人が、他者に感染を広げる可能性があります。

## 4. ペットはCOVID-19に感染し、これを拡散する可能性がありますか？

これまでに、米国では、主にCOVID-19感染者との濃厚接触の後に、COVID-19検査で陽性となった動物の症例が何件か報告されています。状況によっては、ウイルスが人から動物に広がる可能性があるようです。しかし、人間やペットの飼い主がペットからCOVID-19に感染したという報告はありません。現時点では、犬や猫を含むペットがCOVID-19を人間に拡散するという証拠はありません。

## 5. 勤務中にCOVID-19に感染しないようにするにはどうすればよいですか？

COVID-19に関連する症状のあるスタッフは、自宅待機を行い、



## 重要なメッセージ

ペットが人にCOVID-19を拡散したという症例はありません。

ただし、ペットは他の病気を人に広める可能性があるため、ペットに接する前後は手を洗ってください。

動物の飼育員や管理スタッフは、病気の動物や病気にさらされた動物の取り扱いに関する標準手順に従ってください。

詳細については：

## ロサンゼルス郡公衆衛生局

2-1-1までお電話ください

<http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/>

アメリカ疾病予防管理センター  
<http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html>

# コロナウイルス感染症 (COVID-19)

検査の必要性について医療従事者に相談して下さい。COVID-19検査で陽性と判定された人、またはCOVID-19に感染していると医療従事者によって診断された人は自己隔離を行い、実験室レベルの検査でCOVID-19への感染を確認された症例と濃厚接触した人は、職場から帰宅し、自己検疫を行う必要があります。シェルター内ではフェイスカバーを着用し、シェルター全域で可能な限り物理的な距離を確保する必要があります。

物理的距離を置くことができない場合（獣医師の処置中など）、シェルターのスタッフは適切な個人用防護具を着用する必要があります。詳細については、獣医診療スタッフ向けガイダンスを参照してください。

## 6. 呼吸器症状のある人と濃厚接触していたペットを扱う場合はどうすればよいですか？

現時点では、動物の毛からの病気の伝染のリスクは低いようですが、シェルタースタッフは、それが判明するまで予防措置を講じることをお勧めします。

- マスク、ガウン、手袋を着用してください。愛玩動物の履歴に基づいて推奨される個人用防護具 (PPE) については[こちら](#)を参照してください。
- 動物に触れる前後に石鹸と水で手をよく洗ってください。
- ペットを扱っている間、顔をなめさせたり、撫でる、抱きしめる、手で食べ物を与える、食べ物を共有するなど、過度の接触は避けてください。

## 7. COVID-19に感染した住居からペットを引き取る必要がある場合はどうすればよいですか？

- 可能であれば、人から人への感染を防ぐために家屋内に入らないようにしてください。スタッフは家人から少なくとも6フィートの距離を保ち、環境との接触を制限しながら、ペットを回収する必要があります。動物管理スタッフと動物を引き渡す居住者の双方が、この短時間のやり取りの間、適切なフェイスカバーを着用してください。食器や水入れ、リーシュ、おもちゃなどのアイテムは、その家庭から持ち出さないでください。
- ペットを扱う前後に手を洗ってください（石鹸と水、または少なくともアルコール濃度60%以上の手指消毒剤を使用してください）。シェルターに戻ったら、トラックを消毒し、手を洗い、衣服を着替えてください。
- ペットの引き取りに、COVID-19に感染した家庭の方々とのやり取りや、汚染された環境への曝露が含まれる場合は[PPE](#)の使用、およびPPEの適切な使用方法に関するトレーニングを受けることが推奨されます。動物がシェルターに戻された後、すべてのPPEと履物を取り外して廃棄するか、それらの洗濯および消毒を行ってください（該当する場合）。

## 8. シェルターで保護されているペットの場合、どうすればよいですか？

- ペットを受け入れのために取り扱う際は、洗濯できる手袋とガウン/つなぎ服と専用の靴を着用してください。
- 手袋を後、取り外した後、各動物の取り扱いの合間に手を洗ってください。
- これらの動物やペットに局所消毒剤を入浴または塗布することは、今は推奨されていません。
- ウイルスにさらされた動物が接触した共有エリアの表面を直ちに消毒してください。
- ペットを、ウイルスにさらされた動物専用の部屋に隔離し、一般の動物から遠ざけてください。から遠ざけてください。曝露された動物は種ごとに分けて収容してください（例えば、猫と犬は別の病棟に隔離する）。
- 犬舎にペットがウイルスにさらされたことを示す内容、および「Do Not Touch（手を触れないでください）」

# コロナウイルス感染症 (COVID-19)

)」の標識を掲示してください。

- 排泄および運動のためにペットを屋外の消毒のできる専用の場所に連れ出すことはできますが、他の動物と直接接触させないでください。
- 病気の兆候について各動物を注意深く観察し、兆候が表れたら直ちに公衆衛生局の獣医公衆衛生プログラムに報告してください。
- 給餌、清掃および医療行為のためにこの部屋をアクセスする少数のスタッフを特定してください。これは、シェルター内でウイルスが広がる可能性を減らすためです。COVID-19による合併症のリスクが高いスタッフは、これらの動物との接触を避ける必要があります。労働衛生監視のために動物と接触したすべてのスタッフを記録してください。
- シェルターと動物の輸送に使用される車両の消毒については、シェルターの標準手順に従ってください。シェルター全体の内、該当する部屋を一番最後に掃除してください。
- 接触の多い場所（手すり、机、リーシュ、容器、コンピューター）の衛生状態を向上させます。
- ペットを飼い主にできるだけ早く返却してください。ウイルスに曝露したペットを養子縁組または里親に預ける必要がある場合は、最後に曝露したと判明している日から14日間は最初にシェルターで飼育してください。