

# مسارات اتخاذ القرارات بشأن الأعراض وحالات المخالطة في مراكز الرعاية والتعليم المبكر ومدارس الصفوف من مرحلة رياض الأطفال الانتقالية إلى المرحلة الثانوية


إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس

آخر تحديث: 9/20/2021

مسارات اتخاذ القرارات *للأطفال* الذين يعانون من أعراض


# مسارات اتخاذ القرارات للأطفال الذين يعانون من أعراض قبل دخول<sup>1</sup> مؤسسة تعليمية، بغض النظر عن حالة التطعيم

1 إذا شعر الطفل بالتعب في المنشأة، يجب وضعه في منطقة عزل (يفضل أن تكون في الهواء الطلق بعيداً جسدياً عن يرافقه) مع اتباع مسارات القرارات الموضحة أدناه.



# مسارات اتخاذ القرارات للمخالطين غير المحصّنين لطفل يحتفل بإصابته بالعدوى<sup>1</sup> في مؤسسة تعليمية


<sup>1</sup> الطفل المحتمل إصابته بالعدوى طفل يعاني من واحد أو أكثر من أعراض تدل على إصابة محتملة بكوفيد-19. مخالطو الطفل المحتمل إصابته بالعدوى الأشخاص في المنشأة الذين كانوا على بعد 6 أقدام لمدة ≤ 15 دقيقة خلال 24 ساعة من طفل محتمل إصابته بالعدوى أو لامسوا سوائله / إفرازاته الجسدية ملامسة مباشرة.



<sup>2</sup> تتأكد المخالطة لمخالط طفل يحتفل إصابته بالعدوى إذا تلقى الموقع إشعارًا بأن نتيجة الطفل في اختبار كوفيد-19 التشخيصي الفيروسي إيجابية أو شخص مقدم رعاية طبية حالته بأنها إصابة بكوفيد-19.

# مسارات اتخاذ القرارات للمخالطين المحصنين بالكامل لطفل يُحتمل إصابته بالعدوى<sup>1</sup> في مؤسسة تعليمية

<sup>1</sup> الطفل المحتمل إصابته بالعدوى طفل يعاني من واحد أو أكثر من أعراض تدل على إصابة محتملة بكوفيد-19. مخالطو الطفل المحتمل إصابته بالعدوى الأشخاص في المنشأة الذين كانوا على بعد 6 أقدام لمدة  $\leq 15$  دقيقة خلال 24 ساعة من طفل محتمل إصابته بالعدوى أو لامسوا سوائله / إفرازاته الجسدية ملامسة مباشرة.




<sup>2</sup> تتأكد المخالطة لمخالط طفل يحتمل إصابته بالعدوى إذا تلقى الموقع إشعارًا بأن نتيجة الطفل في اختبار كوفيد-19 التشخيصي الفيروسي إيجابية أو شخّص مقدم رعاية طبية حالته بأنها إصابة بكوفيد-19.

مسارات اتخاذ القرارات *للموظفين* الذين يعانون من أعراض

# مسارات اتخاذ القرارات للموظفين غير المحصّنين الذين يعانون من أعراض قبل دخول<sup>1</sup> مؤسسة تعليمية، بغض النظر عن حالة التطعيم


<sup>1</sup> إذا شعر الموظف بالتعب في المنشأة، يجب وضعه في منطقة عزل (يفضل أن تكون في الهواء الطلق بعيدًا جسديًا عن من يرافقه) مع اتباع مسارات القرارات الموضحة أدناه.



<sup>1</sup> تشمل الأعراض المرتبطة بعدوى كوفيد-19 المحتملة لدى البالغين ما يلي: حمى  $\geq 100.4$  درجة فهرنهايت أو الشعور بالحمى (قشعريرة وتعرق)؛ السعال؛ ضيق التنفس؛ فقدان جديد لحاسة التذوق أو الشم؛ التعب؛ الرشح أو احتقان الأنف؛ آلام العضلات أو الجسم؛ الصداع؛ التهاب الحلق؛ الغثيان أو القيء؛ الإسهال. إذا لم تكن الأعراض ضمن ما سبق ذكره، ولكن لا يزال هناك قلق، يوصى بإجراء تقييم إضافي لدى مقدم رعاية طبية.

# مسارات اتخاذ القرارات للمخالطين غير المحصنين لموظف يحتمل إصابته بالعدوى<sup>1</sup> في مؤسسة تعليمية


<sup>1</sup> الموظف المحتمل إصابته بالعدوى موظف يعاني من واحد أو أكثر من أعراض تدل على احتمال الإصابة بكوفيد-19. مخالطوا الموظف المحتمل إصابته بالعدوى الأشخاص في المنشأة الذين كانوا على بعد 6 أقدام لمدة ≤ 15 دقيقة خلال 24 ساعة من موظف محتمل إصابته بالعدوى أو لامسوا سوائله / إفرازاته الجسدية ملامسة مباشرة.





# مسارات اتخاذ القرارات للمخالطين المحصنين بالكامل لموظف يحتمل إصابته بالعدوى<sup>1</sup> في مؤسسة تعليمية

<sup>1</sup> الموظف المحتمل إصابته بالعدوى موظف يعاني من واحد أو أكثر من أعراض تدل على احتمال الإصابة بكوفيد-19. مخالطو الموظف المحتمل إصابته بالعدوى الأشخاص في المنشأة الذين كانوا على بعد 6 أقدام لمدة ≤ 15 دقيقة خلال 24 ساعة من موظف محتمل إصابته بالعدوى أو لأمسوا سوائله / إفرازاته الجسدية ملامسة مباشرة.



مسارات اتخاذ قرارات الحجر الصحي للأطفال والموظفين **المخالطين** في مراكز الرعاية والتعليم المبكر ومدارس الصفوف من مرحلة رياض الأطفال الانتقالية إلى المرحلة الثانوية

## تعريف المخالطة داخل المدرسة – المخالطون لحالة مؤكدة

**المخالط** شخص خالط مصابًا بكوفيد-19 خلال الفترة المعدية\* إذا حدث واحد على الأقل مما يلي:

- كان الشخص على بعد 6 أقدام من مصاب بكوفيد-19 لمدة 15 دقيقة أو أكثر خلال 24 ساعة؛

أو

- لامس الشخص دون حماية سوائل أو إفرازات جسم مصاب بكوفيد-19. على سبيل المثال، تعرّض لرذاذ سعاله أو عطسه، أو تقاسما كوبًا للشرب أو أواني للأكل، أو قبّل أحدهما الآخر، أو قدّم الرعاية للمصاب دون ارتداء معدات الحماية المناسبة.
- يعتبر الشخص **معدّيًا** وقادرًا على نشر الفيروس للآخرين من يومين قبل ظهور الأعراض لأول مرة حتى انتهاء فترة العزل (أي مرت 10 أيام منذ ظهور الأعراض لأول مرة وعدم وجود حمى لمدة 24 ساعة على الأقل وتحسُن الأعراض)؛ أو، إذا لم تظهر الأعراض مطلقًا، من يومين قبل إجراء الاختبار الذي ظهرت نتيجته إيجابية حتى 10 أيام بعد إجراء هذا الاختبار.

ملاحظة: لا ينبغي اعتبار الشخص مخالطًا ما لم يتأكد البرنامج بشكل معقول من أن التعريف أعلاه ينطبق عليه. ولا ينبغي اعتبار الأشخاص مخالطين لمجرد تواجدهم في الفصل الدراسي أو المجموعة المدرسية نفسها مع مصاب. إذا لم يتمكن البرنامج من تحديد المخالطين، يجب عليه الاتصال بالصحة العامة للحصول على المساعدة الفنية.

# للأطفال المخالطين\*: ما مدة الحجر الصحي؟

وجود أعراض عند الطفل

بغض النظر عن حالة التطعيم

استشر مقدم رعاية طبية لمزيد من التقييم

اتبع إرشادات الاستبعاد وفقًا لمسارات قرار إدارة الصحة العامة للأطفال المصابين بأعراض (انظر الصفحة 3)

لا يوجد أعراض عند الطفل

غير محصن بالكامل

الحجر الصحي الروتيني  
يوصى بالاختبار بشدة

في حالة عدم وجود اختبار، ينتهي الحجر الصحي بعد اليوم العاشر

إذا أخذت عينة الاختبار السلبي في **اليوم الخامس أو بعده** ينتهي الحجر الصحي بعد اليوم السابع

**خيار الحجر الصحي المعدل للطلاب من رياض الأطفال-المرحلة الثانوية\*\***  
الاختبار مرتين أسبوعيًا حتى ينتهي الحجر الصحي (الاختبار الأول في اليوم الأول أو الثاني؛ والاختبار الثاني في اليوم الخامس)

يمكن للطلاب الذهاب إلى المدرسة للتعليم الشخصي، إلا أن عليهم بخلاف هذا الحجر الصحي في المنزل. إذا أخذت عينة اختبار ظهرت نتيجته سلبية في **اليوم الخامس أو بعده**، ينتهي الحجر الصحي بعد اليوم السابع

محصّن بالكامل

يوصى بالاختبار

لا يحتاج إلى الحجر الصحي


تعافي من مرض كوفيد-19 خلال آخر 90 يومًا

لا يحتاج للاختبار

لا يحتاج إلى الحجر الصحي

راقب الأعراض حتى اليوم 14

## للموظفين المخالطين\*: ما مدة الحجر الصحي؟



راقب الأعراض حتى اليوم 14

