


مسیرهای تصمیم‌گیری مربوط به علائم بیماری و مواجهه در مراقبت زود هنگام و مراکز خدمات آموزشی و مدارس TK-12

اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس
بروز رسانی شده: **9/20/2021**

مسیرهای تصمیم‌گیری برای کودکان مبتلا به علائم بیماری


مسیرهای تصمیم‌گیری برای کودکان مبتلا به علائم قبل از ورود¹ به یک مؤسسه آموزشی، فارغ از وضعیت واکسیناسیون

¹ در صورت نامساعد شدن حال کودک در مجموعه، او را در یک محوطه ایزوله قرار دهید (از لحاظ فیزیکی دور از حاضرین، در حالت ایده آل در فضای باز) و مسیرهای تصمیم‌گیری که در زیر شرح داده شده است را دنبال کنید.



مسیرهای تصمیم‌گیری برای مخاطبین واکسینه نشده کودک بالقوه مبتلا¹ در یک مؤسسه آموزشی


1 کودک بالقوه مبتلا کودکیست که دارای $1 \leq$ علائم مشابه با ابتلای احتمالی به کووید-19 باشد. مخاطبین نزدیک کودک بالقوه مبتلا، افرادی در مجموعه هستند که در یک بازه زمانی 24 ساعته، به مدت $15 \leq$ دقیقه در فاصله 6 فوتی کودک بالقوه مبتلا بودند یا با مایعات بدن/ترشحات کودک بالقوه مبتلا تماس مستقیم داشتند.



2 مواجهه مخاطب نزدیک با کودک بالقوه مبتلا تأیید می‌شود مشروط به آنکه مجموعه مطلع شود تست تشخیصی ویروسی کووید-19 کودک بالقوه مبتلا مثبت شده یا ارائه دهنده خدمات پزشکی ابتلای او به عفونت کووید-19 را تشخیص داده است.

مسیرهای تصمیم‌گیری برای مخاطبین کاملاً واکسینه شده کودک بالقوه مبتلا¹ در یک مؤسسه آموزشی

1 کودک بالقوه مبتلا کودکیست که دارای ≤ 1 علائم مشابه با ابتلای احتمالی به کووید-19 باشد. **مخاطبین نزدیک کودک بالقوه مبتلا**، افرادی در مجموعه هستند که در یک بازه زمانی 24 ساعته، به مدت ≤ 15 دقیقه در فاصله 6 فوتی کودک بالقوه مبتلا بودند یا با مایعات بدن/ترشحات کودک بالقوه مبتلا تماس مستقیم داشتند.




2مواجهه مخاطب نزدیک با کودک بالقوه مبتلا تأیید می‌شود مشروط به آنکه مجموعه مطلع شود تست تشخیصی ویروسی کووید-19 کودک بالقوه مبتلا مثبت شده یا ارائه دهنده خدمات پزشکی ابتلای او به عفونت کووید-19 را تشخیص داده است.

مسیرهای تصمیم‌گیری برای **کارکنان** مبتلا به علائم بیماری

مسیرهای تصمیم‌گیری برای کارکنان واکسینه نشده مبتلا به علائم قبل از ورود¹ به یک مؤسسه آموزشی، فارغ از وضعیت واکسیناسیون

¹در صورت نامساعد شدن حال کارمند در مجموعه، او را در یک محوطه ایزوله قرار دهید (از لحاظ فیزیکی دور از حاضرین در حالت ایده آل در فضای باز) و مسیرهای تصمیم‌گیری زیر را دنبال کنید.



¹علائم مرتبط با ابتلای احتمالی به کووید-19 در بزرگسالان: تب $\leq 100.4^{\circ}\text{F}$ یا احساس تب (لرز، عرق کردن)؛ سرفه؛ تنگی نفس؛ از دست دادن ناگهانی حس چشایی یا بویایی، خستگی مفرط؛ آبریزش یا گرفتگی بینی، بدن‌درد یا درد عضلانی؛ سردرد؛ گلودرد؛ حالت تهوع یا استفراغ؛ اسهال. اگر علائمی ذکر نشده اما همچنان نگرانی وجود دارد، ارزیابی تکمیلی توسط ارائه دهنده خدمات پزشکی توصیه می‌شود.

مسیرهای تصمیم‌گیری برای مخاطبین واکسینه نشده کارمند بالقوه مبتلا¹ در یک مؤسسه آموزشی


¹کارمند بالقوه مبتلا کارمند است که دارای $1 \leq$ از علائم مشابه با ابتلای احتمالی به کووید-19 باشد. مخاطبین نزدیک کارمند بالقوه مبتلا، افرادی در مجموعه هستند که در یک بازه زمانی 24 ساعته، به مدت $15 \leq$ دقیقه در فاصله 6 فوتی کارمند بالقوه مبتلا بودند یا با مایعات بدن/ترشحات کارمند بالقوه مبتلا تماس مستقیم داشتند.



²مواجهه مخاطب نزدیک با کارمند بالقوه مبتلا تأیید می‌شود مشروط به آنکه مجموعه مطلع شود تست تشخیصی ویروسی کووید-19 کارمند بالقوه مبتلا مثبت شده یا ارائه دهنده خدمات پزشکی ابتلای او به عفونت کووید-19 را تشخیص داده است.

مسیرهای تصمیم‌گیری برای مخاطبین کاملاً واكسینه شده کارمند بالقوه مبتلا¹ در یک مؤسسه آموزشی

¹کارمند بالقوه مبتلا کارمند است که دارای $1 \leq$ علائم مشابه با ابتلای احتمالی به کووید-19 باشد. مخاطبین نزدیک کارمند بالقوه مبتلا، افرادی در مجموعه هستند که در یک بازه زمانی 24 ساعته، به مدت $15 \leq$ دقیقه در فاصله 6 فوتی کارمند بالقوه مبتلا بودند یا با مایعات بدن/ترشحات کارمند بالقوه مبتلا تماس مستقیم داشتند.



²مواجهه مخاطب نزدیک با کارمند بالقوه مبتلا تأیید می‌شود مشروط به آنکه مجموعه مطلع شود تست تشخیصی ویروسی کووید-19 کارمند بالقوه مبتلا مثبت شده یا ارائه دهنده خدمات پزشکی ابتلای او به عفونت کووید-19 را تشخیص داده است.

مسیرهای قرنطینه برای کودکان و کارکنان دارای **مواجهه**
در مراکز مراقبت زودهنگام و مراکز خدمات آموزشی و مدارس TK-12

شناسایی موارد مواجهه در پردیس دانشگاه - مخاطبین نزدیک مورد ابتلای تأیید شده

مخاطب نزدیک فردیست که در طول دوره واگیرداری بیماری* در مواجهه با فردی قرار گرفته که ابتلای او به کووید-19 تشخیص داده شده است، مشروط به آنکه حداقل یکی از موارد زیر رخ داده باشد:

• فرد در یک بازه زمانی 24 ساعته، مجموعاً 15 دقیقه یا بیشتر در فاصله 6 فوتی فرد مبتلا به کووید-19 بوده است؛

یا

• فرد با مایعات بدن و/یا ترشحات شخص مبتلا به کووید-19، تماس محافظت نشده داشته است. برای مثال، به سمت آنان سرفه یا عطسه کردند، آنان لیوان نوشیدنی یا ظروف غذا را به اشتراک گذاشتند، همدیگر را بوسیدند، یا بدون پوشیدن تجهیزات حفاظتی مناسب از او مراقبت کردند.


• فرد از ۲ روز قبل از نخستین مرتبه آغاز علائم تا پایان دوره انزوا **واگیردار** تلقی می‌شود و قادر است ویروس را به دیگران سرایت دهد (یعنی 10 روز از نخستین مرتبه آغاز علائم سپری شده باشد و فرد به مدت حداقل 24 ساعت تب نکرده باشد و علائم بهبود یافته باشند)؛ یا، اگر علائم هرگز بروز نکنند، فرد از 2 روز قبل از انجام تست مثبت خود تا 10 روز پس از آن واگیردار تلقی می‌شود.

توجه: فرد نباید مخاطب نزدیک تلقی شود مگر اینکه برنامه به‌طور منطقی مطمئن باشد که آنان با تعریف بالا منطبق هستند. افراد نباید فقط به

دلیل اینکه با یک فرد مبتلا در کلاس یا گروه مدرسه مشترک حضور داشتند، مخاطب نزدیک تلقی شوند. اگر یک برنامه نتواند تعیین کند که

چه کسی مخاطب نزدیک است، آنان باید برای کمک فنی با اداره بهداشت عمومی تماس بگیرند.

برای کودکان در معرض ابتلا*: قرنطینه چه مدت است؟



نظارت بر علائم تا روز 14

* از راهنمای قرنطینه خانگی اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس تبعیت می‌کند. ** قرنطینه اصلاح شده فقط در مورد دانش‌آموزانی از مدرسه TK-12 اعمال می‌شود که در محیط مدرسه در معرض ابتلا قرار گرفتند.

برای کارمندان در معرض ابتلا*: قرنطینه چه مدت است؟



* از راهنمای قرنطینه خانگی اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس پیروی می‌کند که به کارکنان امکان می‌دهد به محض خروج از قرنطینه، به سر کار خود بازگردند، که ممکن است قبل از زمانی باشد که معیارهای بازگشت به کار Cal/OSHA برآورده می‌سازند.