



# کووید-19 حقایق واکسن

## واکسن ها از بدترین عواقب کووید حفاظت می کنند.

- واکسن کووید-19 از خطر ابتلا به بیماری بسیار شدید ناشی از کووید-19، بستری شدن در بیمارستان یا مرگ می‌کاهد. همچنین خطر ابتلایان به کووید طولانی را کاهش می‌دهد.
- هم اکنون، تمامی واکسن های کووید-19 فایزر و مادرنای بروز شده (دو ظرفیتی) هستند. یعنی آنها بروز شده اند تا در مقابل تعداد بیشتری از جهش های اخیر ویروس ها حفاظت کنند.



## واکسن ها برای همگان موجود است

- واکسن های کووید-19 رایگان است، حتی اگر بیمه ندارید
- درباره وضعیت مهاجرتتان از شما سؤال نخواهد شد



رایگان

## تمامی افراد 6 ماهه و بزرگتر باید حداقل یک دوز بروز شده واکسن کووید-19 دریافت کنند.

- **هر فرد از سنین 6 سال و بزرگتر** که قبلاً یک دوز واکسن بروز شده دریافت کرده است، بروز است. افراد زیر ممکن است دوزهای اضافی دریافت کنند:
  - **بزرگسالان از سنین 65 سال و بزرگتر** می توانند یک دوز دوم بروز شده، حداقل 4 ماه پس از اولین دوز بروز شده شان دریافت کنند.
  - **افرادی که دارای نقص ایمنی هستند** می توانند دوزهای بروز شده اضافی دریافت کنند. با پزشک خود درباره اینکه کدام برنامه برای شما بهترین است، صحبت کنید.
- **افرادی که واکسینه نیستند** باید هم اکنون یک دوز واکسن بروز شده دریافت کنند.
- **افرادی که واکسینه هستند** اما واکسن بروز شده دریافت نکردند، باید حداقل 2 ماه پس از آخرین دوز واکسن اصلی ( تک ظرفیتی)، یک واکسن بروز شده دریافت کنند.
- **کودکان از سنین 6 ماه تا پایان 5 سال** ممکن است نیاز به چند دوز واکسن داشته باشند، از جمله حداقل یک دوز بروز شده. تعداد دوزها بستگی به سنشان و نوع(انواع) واکسنی که قبلاً دریافت کردند دارد.
- همگان باید واکسینه شوند حتی اگر باردار یا شیرده هستند یا کووید-19 داشته اند.
- برای اطلاعات بیشتر، از [cdc.gov/coronavirus/vaccine](https://www.cdc.gov/coronavirus/vaccine) دیدن کنید.



توجه: واکسن تک ظرفیتی نوواوکس برای افراد سن +12 و در برخی موقعیت ها به عنوان یک تقویتی برای افراد +18 در دسترس است.  
واکسن تک ظرفیتی جانسون و جانسون دیگر در ایالات متحده موجود نیست.

# کووید-19 حقایق واکسن




## نحوه دریافت واکسن

صدها مرکز در سراسر شهرستان لس آنجلس وجود دارد - بسیاری از آنها آخر هفته‌ها و غروب باز هستند و نیازی به تعیین وقت قبلی ندارند.

برای یافتن مکانی در محله خود:

- به نشانی [ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated](https://ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated) مراجعه نمایید یا به شماره **1-833-540-0473** تلفن کنید.
  - همچنین می‌توانید با شماره 1-1-2 تماس بگیرید، یا از پزشک یا داروساز محلی خود بپرسید.
  - ایاب و ذهاب رایگان و واکسیناسیون خانگی در دسترس است.
- افراد صغیر برای واکسینه شدن به رضایت‌نامه والد یا سرپرست قانونی خود نیاز دارند.



## عوارض جانبی جدی نادر هستند.

- عوارض جانبی شایع عبارتند از درد، تورم و قرمزی در محل تزریق واکسن، درد عضلانی یا درد مفصل، تورم گره‌های لنفاوی، تب، لرز، سردرد و احساس خستگی. عوارض جانبی در کودکان خردسال نیز عبارتند از گریه، بهانه‌گیری، خواب‌آلودگی و بی‌اشتهایی.
- بروز عوارض جانبی نشانه آن است که سیستم ایمنی شما در حال **ایجاد حفاظت** است. این عوارض جانبی ممکن است بر توانایی شما در انجام برخی فعالیت‌های روزانه اثر بگذارند اما احتمالاً طی یک یا دو روز پس از دریافت واکسن ناپدید می‌شوند.
- عوارض جانبی جدی نادر هستند.



## واکسن های کووید-19 ایمن و مؤثر هستند.

- ابتلا به کووید-19 از طریق دریافت واکسن ممکن نیست. هیچ یک از واکسن‌ها حاوی ویروس عامل کووید-19 نیستند.
- واکسن‌ها روی ده‌ها هزار نفر از جمله افراد رنگین‌پوست، سالخوردگان و افراد مبتلا به عارضه‌های پزشکی آزمایش شدند و **ایمنی و اثربخشی** آنها احراز شده است.
- از دسامبر 2020، **صدها میلیون نفر** بصورت ایمن واکسن کووید-19 دریافت کرده‌اند.
- واکسن‌های کووید-19 همچنان تحت **شدیدترین نظارت ایمنی** در تاریخ ایالات متحده قرار می‌گیرند.
- هیچ مدرکی در دست نیست که واکسیناسیون کووید-19 باعث بروز مشکلات باروری می‌شود. آنها برای افراد باردار ایمن هستند و از سوی متخصصان بارداری توصیه می‌شوند.

