



COVID-19 ワクチンの基本情報

ワクチン接種で、新型コロナウイルスによる最悪の事態を回避することができます。



- ワクチンは、COVID-19による重症化、入院、および死亡リスクを低減させます。また、コロナ後遺症になるリスクも低くなります。
- ファイザー社、モデルナ社、ノババックス社のワクチンは、新たなウイルス株に対応するために**改良されました**。
- 改良型ワクチンは、時間の経過とともに薄れた（前回受けた接種や感染からの）免疫を強化することができます。



生後6ヶ月以上の全ての人に、
改良型コロナワクチンの接種が推奨されています。



- **5歳以上のすべての人**に改良型の新型コロナワクチンを今年の秋に1回接種することが推奨されています。
- **生後6ヶ月から4歳までの子ども**に必要な接種回数については、かかりつけの医師にご相談ください。前年度に何回接種を受けたかに応じて異なります。
- **免疫不全の症状がある人**は、改良型ワクチンの追加接種が必要になることがあります。かかりつけ医にあなたに適切な接種時期についてご相談ください。
- **妊娠中の人**や**授乳中の人**、過去にコロナウイルスに感染していた場合でも、ワクチン接種を受けることがすべての人に推奨されています。
- 12歳以上で、ファイザー社やモデルナ社のワクチンを受けることができなかった人は、ノババックス社製の改良型ワクチンを最終接種から最低2ヶ月経過後に、受けることができます。
- 詳細はこちらをご覧ください。 [cdc.gov/coronavirus/vaccine](https://www.cdc.gov/coronavirus/vaccine).



COVID-19 ワクチンの基本情報


ワクチンを受ける場所

医療保険に加入している場合は、医療従事者に連絡し、ワクチン接種の予約を取ってください。保険に加入していない場合でも、多くの薬局や地域のヘルスセンターで接種を受けることができます。注：未成年者は保護者または法定後見人の同意書が必要です。

最寄りの接種会場を見つけるには：

publichealth.lacounty.gov/vaccinesにアクセス、または**1-833-540-0473**か**2-1-1**までお電話ください。

訪問接種をご希望の人は、**1-833-540-0473**までお電話でお問い合わせするか、VaccinateLACounty.comから「In-Home Vaccines」（訪問接種）をクリックしてください。



深刻な副反応はまれです。

- 一般的な副反応には、接種部位の痛み、腫れや赤み、筋肉や関節の痛み、リンパ腺の腫れ、発熱、悪寒、頭痛、疲労感を含みます。幼い子供の副反応には、よく泣く、イライラする、眠気、食欲不振などがあります。
- 副反応は、体の免疫系が**抗体を産生している**証拠です。そのために日常のアクティビティに多少支障が出るかもしれませんが、ワクチン接種から1~2日で治まります。
- 深刻な副反応を起こすことは稀です。



COVID-19ワクチンは安全で効果的です。

- ワクチンからCOVID-19に感染することはありません。どのワクチンにもCOVID-19を引き起こすウイルスは含まれていません。
- ワクチンは、有色人種、高齢者、基礎疾患のある人などを含む、何万人もの人々で臨床試験が行われており、**安全で効果的**であることが確認されています。
- 2020年12月以来、**数億人もの人々**が安全にCOVID-19ワクチンの接種を受けています。
- COVID-19ワクチンは、米国史上最も**集中的にその安全性の監視**が継続されています。
- COVID-19のワクチンが不妊症の原因になるという証拠はありません。COVID-19ワクチンは妊娠中の人々にとって安全であり、妊娠の専門家たちによって推奨されています。

