



COVID-19 疫苗的事實



疫苗可以預防COVID-19的最嚴重後果

- COVID-19疫苗可以減少你因COVID-19罹患重病、住院或死亡的風險。它還可以降低罹患長期COVID的風險。
- 輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)和諾瓦瓦克斯(Novavax)的COVID-19疫苗都已經過**更新**來預防近期的病毒變異株。
- 更新版疫苗能夠增強之前可能隨時間推移而減弱的防護力（來自之前的疫苗接種或感染）。



所有年齡在6個月及以上的人都應該接種
更新版COVID-19疫苗。



- **所有5歲及以上的人**今年秋季都應該接種一劑更新版COVID疫苗。
- **6個月至4歲的兒童**應該諮詢他們的醫療服務提供者他們需要接種多少劑疫苗。這將取決於他們在之前幾年接種過多少劑疫苗。
- **免疫功能受損的人**可能需要接種額外的更新版疫苗。請與你的醫生討論最適合你的接種時間表。
- 每個人都應該接種疫苗，即使正在**懷孕或哺乳**，或者已經患過COVID-19。
- 不能接種輝瑞或莫德納疫苗的12歲及以上人士，在上一次接種疫苗至少2個月之後，可以接種一劑更新版諾瓦瓦克斯疫苗。
- 瞭解更多資訊，請訪問 [cdc.gov/coronavirus/vaccine](https://www.cdc.gov/coronavirus/vaccine)。



COVID-19 疫苗的事實

在哪裡接種疫苗

如果你有健康保險，請聯繫你的醫療服務提供者預約接種疫苗。在許多藥房和社區衛生中心也為沒有保險的人士提供疫苗。請注意：未成年人需要父母或法定監護人的同意才能接種疫苗。

在你附近找到一處疫苗接種點，請訪問 publichealth.lacounty.gov/vaccines 或致電 **1-833-540-0473** 或 **2-1-1**。

可提供居家接種疫苗服務，要申請此項服務，請致電 **1-833-540-0473** 或者訪問 VaccinateLACounty.com 並點擊「居家接種疫苗」。



疫苗的嚴重副作用很罕見

- 常見副作用包括：接種疫苗的部位疼痛、腫脹和發紅、肌肉或關節疼痛、淋巴結腫大、發燒、發冷、頭痛和感覺疲倦。幼兒接種疫苗后可能出現的副作用還包括哭泣、煩躁、困倦和食慾不振。
- 出現副作用表明你的免疫系統正在**建立保護作用**。副作用可能會影響你進行一些日常活動的能力，但它們應該會在接種疫苗后的一兩天內消失。
- 嚴重的副作用很罕見。



COVID-19疫苗是安全有效的

- 接種疫苗不會讓你感染COVID-19。沒有一種疫苗含有導致COVID-19的病毒。
- 這些疫苗已在數萬人身上進行了測試，其中包括有色人種、老年人和有健康問題的個人，測試結果發現疫苗是**安全且有效**的。
- 自2020年12月以來，已有**數億人**安全接種了COVID-19疫苗。
- COVID-19疫苗將繼續接受美國歷史上最**嚴格的安全監測**。
- 沒有證據表明COVID-19疫苗會導致生育問題。它們對孕婦是安全的，且妊娠專家建議孕婦接種疫苗。

