



COVID-19 ブースター接種 感染予防効果を高めましょう!

COVID-19重症化予防効果を高めましょう

- 改良型 (2価) PfizerおよびModernaのCOVID-19ワクチンは従来の新型コロナウイルスと様々なオミクロン株の両方に対応することができます。
- 改良型ブースターワクチンを接種することで、前回のワクチン接種から時間の経過とともに弱まったと思われる免疫が強化されます。その結果COVID-19の最悪の事態から効果的に身を守ることができるようになります。



最終ワクチン接種日から最低2ヶ月経過している方は改良型ブースターワクチンを接種してください。

一部の例外を除き、**生後6ヶ月以上のすべての方に、改良型(2価)ブースターワクチン接種を受けることが推奨されています。**



Pfizerの初回接種を完了している、生後6ヶ月から4歳までの乳幼児は、現在ブースター接種の対象となっていません。

65歳以上の方々にとってブースターワクチンを受けるのは**特に重要になります。**

- 改良型ブースターワクチンを受ける時期は、最終初回接種または従来ブースターワクチン接種から最低2ヶ月経過してからになります。
- 副反応は初回接種を受けた後に出るものとよく似ています。副反応のほとんどが軽度から中等度で1~2日もすれば治ります。
- Novavaxのブースターワクチンは、まだブースター接種を受けたことがなく、PfizerやModernaのワクチンを受けることができない18歳以上の方が対象となります。初回接種を完了してから6ヶ月後に投与されます。
- 新型コロナワクチンと同時に**インフルエンザの予防注射を受けることもできます!**

過去にCOVID-19に感染したことがある方でもブースター接種が推奨されています

- ワクチン接種を受けることで予防効果をさらに高めることができます。**
- ブースター接種を受けるのは隔離を終了してからにしましょう。発症日または(無症状だった場合は)検査で陽性反応が出た日から3ヶ月待つという選択肢もあります。その3ヶ月間で新型コロナウイルスに再度感染する確率は低いとされているためです。また、感染していた時期とワクチンを受けるまでの間隔を長くあけるほど免疫反応が増強することにつながるとも考えられています。



ワクチンは無料で接種いただけます- 医療保険は必要ありません

- 滞在資格などに関する質問はされません。

詳細は [VaccinateLACounty.com](https://www.vaccinatelacounty.com) にアクセスするか **1-833-540-0473** まで電話でお問合せください。

