

원숭이두창에 대하여 알아야 할 정보

원숭이두창(Monekypox)은 원숭이두창 바이러스로 인해 유발되는 전염성이 강한 전염병입니다. 원숭이두창에 걸린 사람과 가깝게 개인적으로 접촉했던 사람은 위험에 처하게 됩니다.

증상은 노출 후 5-21 일에 보통 시작합니다

주요
증상

발진



발진은 다음과 같을 수 있습니다:

- 혹, 뾰루지, 물집, 상처 혹은 딱지 같습니다
- 성기, 항문, 입, 손 및 얼굴을 포함한 몸의 어느 부분에라도 있습니다
- 한 부위에만 퍼지거나 전신으로 번질 수도 있습니다
- 가렵거나 통증이 있습니다 (특히 입이나 항문 안)

독감 같은 증상

기타
증상



발열/오한



탈진, 근육통증
및 두통



림프절 부기

- 독감 같은 증상은 발진의 시작 이전 혹은 이후 1-4 일에 나타날 수 있습니다.
- 모든 사람이 이런 증상을 겪는 것은 아닙니다.



원숭이두창이 전파되는 방법

원숭이두창은 다음을 포함하여 가깝게, 은밀하거나 장기적인 접촉으로 퍼진다고 알려져 있습니다:

- 키스, 마사지 그리고 포옹과 같은 다른 밀접한 접촉과 성관계 시 발진, 딱지 혹은 상처에 직접적인 피부 간의 접촉.
- 원숭이두창 감염자가 사용하고 세탁하지 않은 물체와 섬유류 (옷, 침구, 타월 혹은 자위기구)의 접촉.
- 호흡 분비물과의 접촉 장기간, 밀접한 대면 접촉 혹은 친밀한 접촉을 하는 동안에 발생할 수 있습니다.

원숭이두창을 가진 사람은 발진이 아물고, 딱지가 떨어지고 새로운 피부막이 생기기 전까지 증상이 시작된 시간으로부터 다른 사람들에게 퍼트릴 수 있습니다. 주로 2-4 주 걸립니다.

원숭이두창을 가지고 있는 임산부는 태아로 바이러스를 전염할 수 있습니다.

일상적인 대화 혹은 감염된 사람 옆으로 지나가는 것만으로 **원숭이두창은 전염되지 않습니다.**

백신 접종은 원숭이두창에 노출되었던 사람을 포함하여 고위험군을 위해 준비 되어있습니다.

항바이러스 치료제는 원숭이두창에 감염되거나 심각한 원숭이두창 증상을 가지고 있는 사람을 위해 준비 되어있습니다.

자세한 정보는 의사와 상의하거나 ph.lacounty.gov/Monkeypox를 방문하십시오.

설명할 수 없는 새로운 발진 혹은 병변이 있다면 바로 **의사에게 연락하세요.**

원숭이두창에 노출된 누군가 또는 의심이 가는 사람과 있었다면 이것은 특히 중요합니다.

의사가 없다면:

- 공중 보건 1-833-540-0473 (매일 오전 8 시-오후 8시30분 운영)으로 전화하거나
- 가까운 곳에 있는 [공중 보건 성건강 클리닉](#)을 확인하십시오.



위치를 찾아보려면
QR 코드를 스캔하십시오