

LO QUE DEBE SABER SOBRE LA VIRUELA DEL MONO

La viruela del mono es una enfermedad contagiosa causada por el virus de la viruela del mono. Cualquiera que haya estado en contacto personal cercano con alguien que tiene viruela del mono está en riesgo.

Symptoms usually start 5-21 days after exposure

**SÍNTOMA
CLAVE**

SARPULLIDO



El sarpullido puede:

- Parecer bultos, espinillas, ampollas, llagas o costras
- Estar en cualquier parte del cuerpo, incluidos los genitales, el ano, la boca, las manos y la cara.
- Estar en una sola área o puede extenderse por todo el cuerpo.
- Causar picazón o dolor (especialmente si está dentro de la boca o el ano).

SÍNTOMAS SIMILARES A LA GRIPE

**OTROS
SÍNTOMAS**



Fiebre/
escalofríos



Agotamiento,
dolores
musculares y
dolor de cabeza



Ganglios
linfáticos
inflamados

- Los síntomas similares a los de la gripe pueden aparecer de 1 a 4 días antes de que comience el sarpullido o después de que comience el sarpullido
- No todos tendrán estos síntomas

CÓMO SE PROPAGA LA VIRUELA DEL MONO

Se sabe que la viruela del mono se propaga por contacto cercano, íntimo y/o prolongado, incluyendo:

- Contacto directo de piel a piel con sarpullido, costras o llagas de viruela del mono durante las relaciones sexuales y otro contacto íntimo como besos, masajes y caricias.
- Contacto con objetos y telas (como ropa, ropa de cama, toallas o juguetes sexuales) que han sido usados por alguien con viruela del mono y que no se han limpiado.
- Contacto con secreciones respiratorias. Esto puede suceder durante el contacto prolongado, cercano, cara a cara o el contacto físico íntimo.

Una persona con viruela del mono puede transmitirla a otros desde el momento en que comienzan los síntomas hasta que el sarpullido haya sanado, las costras se hayan caído y haya una nueva capa de piel. Esto suele tardar de 2 a 4 semanas.

Una persona embarazada con viruela del mono puede transmitir el virus a su feto.

La viruela del mono NO se contagia a través de conversaciones casuales o al caminar junto a alguien que la tiene.

LA VACUNACIÓN está disponible para las personas con mayor riesgo, incluidas las personas que han estado expuestas a la viruela del mono.

EI TRATAMIENTO ANTIVIRAL está disponible para las personas que tienen o corren el riesgo de tener viruela del mono grave. Para obtener más información, hable con su médico o visite ph.lacounty.gov/Monkeypox.

CONTACTE A SU MÉDICO

de inmediato si tiene sarpullido o lesiones. Esto es especialmente importante si estuvo expuesto a alguien con o se sospecha que tiene viruela del mono.

SI NO TIENE MÉDICO:

- Llame a Salud Pública al 1-833-540- 0473 (de 8am a 8:30pm diario), o
- Visite una [clínica de salud sexual de Salud Pública](#) cerca de usted.



Escanea el código QR para encontrar una ubicación