

你應該瞭解的猴痘資訊

猴痘是由猴痘病毒引起的傳染病。任何與猴痘患者有過密切個人接觸的人均有感染的風險。

症狀通常在接觸後 5-21 天出現

主要症狀

皮疹



皮疹可能：

- 看起來像丘疹、皰痘、水皰、瘡或結痂
- 出現在身體任何部位，包括生殖器、肛門、口腔、手部和面部
- 僅出現在一個部位或遍佈全身
- 瘙癢或疼痛（尤其是如果在口腔或肛門內）

流感樣症狀



發燒/發冷



乏力、肌肉酸痛
和頭痛



淋巴結腫大

- 流感樣症狀可能在出現皮疹前 1-4 天和出現皮疹後出現
- 並不是所有人都有這些症狀

其他症狀

有關猴痘的更多資訊，請造訪：ph.lacounty.gov/Monkeypox 2022/9/9 (Traditional Chinese)



猴痘是如何傳播的

目前已知猴痘通過密切、親密和/或長時間接觸傳播，包括：

- 在性交和其他親密接觸（例如接吻、按摩和摟抱）過程中，皮膚直接接觸皮疹、結痂或瘡。
- 接觸猴痘患者使用過但未清洗的物品和織物（例如衣服、床上用品、毛巾或性玩具）。
- 接觸呼吸道分泌物。這種情況可能在長時間和密切的面對面接觸或親密接觸中發生。

從出現症狀，直到皮疹痊愈、結痂脫落並長出新皮膚層之前，猴痘患者均有可能將疾病傳播給他人。這通常需要 2 到 4 週。

患有猴痘的孕婦會透過胎盤將病毒傳染給胎兒。

偶爾交談或經過猴痘患者身旁**不會導致猴痘傳播**。

疫苗現可供高風險人群接種，包括已經接觸過猴痘的人。

抗病毒治療現可供猴痘重症患者或有可能成為重症患者的人群使用。

更多資訊，請諮詢您的醫生或造訪 ph.lacounty.gov/Monkeypox。

如果您出現新的、不明原因的皮疹或病變，請立即**聯絡您的醫生**。如果您接觸過猴痘患者或疑似猴痘患者，這一點尤為重要。

如果您沒有醫生：

- 請致電公共衛生局：
1-833-540-0473
（每天早上 8 點至晚上 8:30），或
- 前往您附近的[公共衛生局性健康診所](#)。



掃描QR碼查找
性健康診所