

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNA CONTRA LA VIRUELA DEL MONO

Detalles sobre la vacuna:

Actualmente, la vacuna JYNNEOS™ es la única vacuna autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para prevenir viruela del mono en las personas. Está aprobada para personas mayores de 18 años, y para menores de 18 años en ciertas circunstancias. JYNNEOS contiene un virus vivo que no se replica muy bien en humanos, lo que significa que no puede infectarlo ni volverlo infeccioso. Se administra en dos inyecciones con 4 semanas de entre sí.

Hoy contamos con un suministro limitado de JYNNEOS en los Estados Unidos, pero se espera tener más en las próximas semanas y meses.

Elegibilidad de la vacuna:

Debido al suministro limitado, Salud Pública actualmente ofrece la vacuna contra la viruela del mono a personas en grupos seleccionados de [alto riesgo](#). La vacuna puede proteger a las personas contra la viruela del mono.

La vacuna no debe administrarse a personas que ya tienen viruela del mono o que muestran señas y síntomas de la viruela del mono.

Las personas con síntomas deben hablar con su médico o llamar al 2-1-1 si no tienen doctor. Además, las personas sin un proveedor que hayan desarrollado sarpullido en el área genital o perianal, pueden acceder a los servicios en [las Clínicas de Salud Sexual](#). (<http://www.publichealth.lacounty.gov/chs/SexualHealthClinicSchedule.SPANISH.pdf>)

Efectos secundarios posteriores a la vacunación:

La mayoría de las personas que reciben la vacuna JYNNEOS solo tienen reacciones menores, como una fiebre leve, cansancio, glándulas inflamadas, enrojecimiento y picazón en el lugar donde se administró la vacuna. Sin embargo, debe discutir cualquier inquietud que tenga con un proveedor de atención médica antes de la administración de la vacuna.

El momento adecuado para ponerse la vacuna:

Los CDC recomiendan que la vacuna se administre dentro de 4 días posteriores a la fecha de exposición a la viruela del mono con el fin de prevenir el desarrollo de la enfermedad. Si la vacuna se administra entre 4 y 14 días después de la fecha de exposición, la vacuna puede reducir los síntomas de la enfermedad, pero es posible que no la prevenga. Se considera que tiene protección completa 2 semanas después de administrarle la segunda dosis de la vacuna. Dado el suministro limitado de vacunas a nivel nacional en estos momentos Salud Pública le dará la primera dosis a aquellos que son elegibles para la vacuna contra la viruela del mono. Tan pronto como se amplíe el suministro federal de vacunas, Salud Pública pondrá administrar la segunda dosis a aquellos que ya recibieron su dosis inicial.

Para obtener más información sobre la vacuna contra la viruela del mono, consulte la Hoja de Información sobre la vacuna: [Vacuna contra la viruela del mono \(JYNNEOS\): lo que debe saber](#) (https://www.immunize.org/vis/pdf/spanish_smallpox_monkeypox.pdf)

[ESCANEE PARA MAS DETALLES SOBRE SU ELEGIBILIDAD](#)



Dado que la información evoluciona rápidamente, visite la página [Salud Pública: Viruela del Mono](#) para obtener información actualizada sobre la elegibilidad y el acceso a la vacuna.

Para más información sobre la viruela del mono, visite: ph.lacounty.gov/Monkeypox/ (Spanish) Revised: 7/25/2022



COUNTY OF LOS ANGELES
Public Health