

Вакцины

для младенцев и детей младшего возраста



Младенцы и дети младшего возраста подвергаются повышенному риску развития тяжелого заболевания в результате заражения болезнью, предотвратимой с помощью вакцины, поскольку их иммунная система в таком возрасте еще не полностью развита. По мере того, как маленькие дети начинают больше взаимодействовать с окружающей средой и другими людьми, вопрос их иммунизации становится все более важным, так как иммунизация ребенка защищает его от тяжелых заболеваний и предупреждает возникновение вспышек внутри различных сообществ, в том числе в детских садах и центрах дошкольного образования.

Вакцинация рекомендуется на разных этапах жизни вашего ребенка в соответствии с календарем прививок, в котором сроки и кратность введения вакцин тщательно рассчитаны по времени таким образом, чтобы вакцина вызвала наиболее сильный иммунный ответ и обеспечила ребенка защитой в самый уязвимый к заболеваниям период его жизни.

Все рекомендуемые вакцины были основательно изучены, и их использование в целях профилактики таких заболеваний, как корь, паротит и ветряная оспа, является безопасным. Вакцины были тщательно протестированы и доказали свою способность обеспечить вашего ребенка защитой от болезней в большей степени, чем если бы он не был вакцинирован.

Для того, чтобы младенцы и дети младшего возраста были обеспечены наибольшей защитой, им требуется своевременно прививаться всеми необходимыми для них вакцинами. Своевременная вакцинация особенно важна в осенний и зимний периоды, когда дети проводят больше времени вместе внутри помещений и риск распространения среди них респираторных инфекций типа COVID-19 и РСВ (респираторно-синцитиальный вирус) увеличивается.

Какими вакцинами мне следует привить своего ребенка?

Младенцев и детей младшего возраста (с рождения и до 6 лет) рекомендуется прививать следующими вакцинами, защищающими от 15 потенциально смертельных инфекционных болезней:

- **Вакцина АКДС:** Серия вакцины, состоящая из 5 доз, рекомендуется для введения начиная с 2-месячного возраста, с целью профилактики дифтерии, столбняка и коклюша, которые наиболее опасны для младенцев.
- **Вакцина против гепатита В:** Серия вакцины, состоящая из 3 доз, рекомендуется для введения начиная с рождения, с целью профилактики вирусного гепатита В, способного вызвать жар, головную боль, слабость, рвоту, желтуху и долгосрочные осложнения здоровья.
- **Вакцина против полиомиелита:** Серия вакцины, состоящая из 4 доз, рекомендуется для введения начиная с 2-месячного возраста, для профилактики полиомиелита - заболевания, сопровождающегося болью в горле, жаром, тошнотой и параличом.



Вакцины

для младенцев и детей младшего возраста



- **Вакцина против КПК:** Рекомендуется введение двух доз: первой - в возрасте с 12 по 15 месяцев, второй - в возрасте с 4 до 6 лет, с целью профилактики следующих высокозаразных заболеваний: корь, эпидемический паротит и краснуха (немецкая корь).
- **Вакцина против ветряной оспы:** Рекомендуется введение двух доз: первой - в возрасте с 12 по 15 месяцев, второй - в возрасте с 4 до 6 лет, с целью профилактики вируса ветряной оспы, способной вызвать возникновение сыпи, жара, инфицированных волдырей, отека мозга или пневмонии.
- **Вакцина против гриппа:** Введение одной дозы рекомендуется ежегодно для большинства детей в возрасте от 6 месяцев. Некоторым детям может потребоваться вторая доза. Лечащий врач вашего ребенка может порекомендовать наиболее оптимальную дозировку для защиты вашего малыша от вируса гриппа, способного вызвать жар, мышечную боль, сильную усталость и спровоцировать респираторную инфекцию.
- **Вакцина против COVID-19:** Вакцина против COVID-19 рекомендуется для детей в возрасте от 6 месяцев. Вакцина также обеспечивает защиту от мультисистемного воспалительного синдрома (MIS-C), возникновение которого может быть спровоцировано наличием у детей инфекции COVID-19. В целях поддержания высокого уровня иммунного ответа детям в возрасте от 6 месяцев до 4 лет требуется несколько доз вакцины против COVID-19, в том числе как минимум 1 доза обновленной вакцины против COVID-19.
 - Ранее не вакцинированным детям: следует получить либо 2 дозы обновленной вакцины против COVID-19 Moderna, либо 3 дозы обновленной вакцины против COVID-19 Pfizer-BioNTech.
 - Детям, ранее вакцинированным дозами мРНК-вакцины: требуются 1 или 2 дозы обновленной вакцины против COVID-19 Moderna или Pfizer-BioNTech, в зависимости от количества предыдущих доз.
 - Детям, ранее своевременно вакцинированным всеми необходимыми дозами вакцины: требуется 1 доза обновленной вакцины против COVID-19 Pfizer-BioNTech или Moderna.Детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет следует прививать дозами вакцины одного и того же производителя (например, все дозы вакцины Pfizer или все дозы вакцины Moderna), за исключением случаев, когда препарат недоступен или имеются противопоказания.
- **Иммунизация против РСВ:** Младенцев в возрасте до 8 месяцев, которые появились на свет во время сезона заболеваемости РСВ или вступают в свой первый сезон заболеваемости РСВ (период октября по март), следует прививать одной дозой препарата Нирсевимаб для обеспечения защиты от респираторно-синцитиального вируса (РСВ), провоцирующего пневмонию и бронхолит у детей раннего возраста. Младенцев и детей в возрасте от 8 до 19 месяцев, подверженных высокому риску заражения РСВ и вступающих в свой второй сезон заболеваемости РСВ, также следует привить одной дозой препарата.



Вакцины

для младенцев и детей младшего возраста



- **Вакцина против ротавирусной инфекции:** Серия вакцины, состоящая из 2-3 доз, рекомендуется для введения начиная с 2-месячного возраста, с целью защиты от вируса, способного вызвать сильную диарею, жар, рвоту и привести к обезвоживанию организма.
- **Вакцина против гемофильной палочки типа b:** Серия вакцины, состоящая из 3-4 доз, рекомендуется для введения начиная с 2-месячного возраста, с целью защиты от бактериальной инфекции, способной привести к развитию менингита, тяжелых проблем с дыханием и пневмонии.
- **Пневмококковая вакцина:** Серия вакцины, состоящая из 4 доз, рекомендуется для введения начиная с 2-месячного возраста, для защиты от многочисленных бактерий, способных спровоцировать развитие пневмонии, поражающей легкие.
- **Вакцина против гепатита А:** Серия вакцины, состоящая из 2 доз, рекомендуется для введения в период с 12 по 23 месяц жизни младенца с интервалом не менее 6 месяцев между дозами, с целью защиты от гепатита А, вирус которого способен вызвать жар, потерю аппетита, желтуху и долгосрочные заболевания печени, почек или крови.

Как я могу привить своего ребенка?

- Поговорите с педиатром / лечащим врачом своего ребенка о вакцинах.
- Если у вашего ребенка нет лечащего врача, посетите веб-страницу <http://publichealth.lacounty.gov/vaccines> для поиска бесплатной или недорогой клиники вакцинации и получения более подробной информации о вакцинах.
- Вы можете привить своего малыша большинством необходимых вакцин за одно посещение! Это вызовет у ребенка меньше дискомфорта и, кроме того, вам не придется лишний раз отвлекаться от других дел.



Колл-центр Службы общественного здравоохранения

Для получения дополнительной информации позвоните в колл-центр Службы общественного здравоохранения по номеру **1-833-540-0473**, линия работает ежедневно с 08:00 до 20:00.



Los Angeles County Department of Public Health

ph.lacounty.gov/vaccines

Vaccines for Infants and Toddlers 10/20/23 (Russian)



COUNTY OF LOS ANGELES
Public Health